

Information før almindelig parodontal behandling

Godtand I/S
Gammel Kongevej 72 C
1850 Frederiksberg

Telefon: 33 24 44 45
Telefontid:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.30
fredag fra kl. 8.00 – 15.00

SMS: 50 30 31 32
Mail: info@godtand.dk

Godtand.dk

Almindelig parodontalbehandling (APA)

Det vigtigste formål med behandling af parodontose er at stoppe sygdommen, så den ikke udvikler sig. Ellers kan det være svært at bevare tænderne på lang sigt. En almindelig parodontalbehandling foretages, når der ved en undersøgelse er konstateret, at noget af kæbeknogle er forsvundet samtidig med, at der findes fordybede tandkødslommer ved 3 tænder eller derover. Den almindelige parodontalbehandling omfatter forebyggelse med instruktion, en udvidet tandrensning i de fordybede tandkødslommer og evt. pudsning af tidligere lagte fyldninger.

Information:

Efter operationen udleveres yderligere information sammen med de smertestillende tabletter, gaze krøller og mundskyllevæske.

Information før almindelig parodontal behandling

Godtand I/S
Gammel Kongevej 72 C
1850 Frederiksberg

Telefon: 33 24 44 45
Telefontid:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.30
fredag fra kl. 8.00 – 15.00

SMS: 50 30 31 32
Mail: info@godtand.dk

Godtand.dk

Sund mund

Sunde tænder sidder fast i kæbeknoglen, og uden på knoglen ligger tandkødet. Det er kun selve tandens krone, der er synlig, mens tandroden normalt ikke ses. Nærmest tandkronen bukker tandkødet rundt og fæster på tanden og knoglen. Herved dannes tandkødslommen (pochen), der ved normale, sunde forhold er 2–3 mm dyb. Sundt tandkød er lyserødt og svagt nubret i overfladen. Selv ved langvarig og grundig tandbørstning samt ved brug af tandstikker eller tandtråd vil det sunde tandkød ikke bløde.

Tandkødsbetændelse

Hvis tænderne ikke bliver børstet rene, vil der samle sig skadelige bakterier på tænderne langs tandkødsranden. Når disse bakterier vokser fast på tænderne, dannes der belægninger – plak. Hvis belægningerne ikke fjernes ret hurtigt med fx tandbørste og tandstikker, vil de vokse til større skadelige bakteriekolonier først og fremmest langs tandkødsranden. Hvis belægningerne ikke fjernes i tide, forkalker de og bliver til tandsten.

Bakteriebelægninger og tandsten ved tandkødsranden irriterer tandkødet og får det til at hæve og blive rødt på grund af begyndende betændelse. Det begynder desuden at bløde fra tandkødet for eksempel ved tandbørstning.

Behandling af tandkødsbetændelse

Hvis bakteriebelægninger og tandsten fjernes, vil tandkødet ret hurtigt blive sundt igen – normalt uden varige skader. Tandsten kan man ikke selv fjerne. Dette gøres af tandlægen eller tandplejeren. Opretholdes mundhygiejnen herefter, vil tandkødet hele efter ca. 14 dage og blødningen standser.

Parodontose

Bliver tandkødsbetændelsen ikke behandlet i tide, vil betændelsen brede sig til kæbeknoglen og udvikle sig til parodontose. Kæbeknoglen omkring tandrødderne reagerer ved at gå i opløsning. Det betyder, at knoglen nærmest tandkødsranden trækker sig tilbage. Tandkødslommen (pochen) bliver dybere. Nu kan bakterier og tandsten trænge endnu længere ned under tandkødet og langs tandroden med det resultat, at betændelsen forværres. Forløbet giver sjældent symptomer, og sygdommen kan blive ret fremskreden, uden man selv opdager det. En fremskreden parodontose vil medføre, at tænderne bliver løse og ofte flytter sig i tandrækken.