

Operationsvejledning til kirurgi-behandling

Godtand I/S

**Gammel Kongevej 72 C
1850 Frederiksberg**

Telefon: 33 24 44 45

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.30
fredag fra kl. 8.00 – 15.00

SMS: 50 30 31 32

Mail: info@godtand.dk

Godtand.dk

Efter operationen

Såret skal være i ro på operationsdagen samt dagen efter. Undgå spising og rygning de første 3 timer efter operationen. Derudover kun flydende eller helt blød kost de første 2 dage. Generelt forsinker tobaksrygning sårheling.

Efter operation af visdomstænder i underkæben kan forekomme forbigående føleforstyrrelser i underlæben og/eller tungen i den opererede side. I op til 3–4 uger efter operationen kan forekomme gener i form af dårlig smag. Madrester kan ophobes i hullet, hvor tanden har siddet.

Smerter

Der udleveres smertestillende tabletter efter operationen.

Mundhygiejne

Der udleveres mundskyllevæske i forbindelse med operationen. Dette kan supplere tandbørstningen den første uge.

Blødning

Der kan forekomme siveblødning fra såret. Den første dag kan anbefales, at hovedet holdes højt og om natten vil det være en god ide med en ekstra pude under hovedet.

Hævelse

Der vil i de efterfølgende dage kunne forekomme lidt hævelse i den opererede side. På første dagen kan man lægge en ispose på den opererede side. Efter 2 dage kan man i stedet bruge moderat varme i 3 gange 5 minutter.

Information

Efter operationen udleveres yderligere information sammen med de smertestillende tabletter, gaze krøller og mundskyllevæske.